




COMUNE RIGNANO FLAMINIO

Città metropolitana Roma capitale

Ufficio LL.PP. ed Appalti- Servizio Ambiente

COME DIFENDERSI DALLA ZANZARA TIGRE



bassa infestazione


media-bassa infestazione

media infestazione

alta infestazione



- 1) Eliminare dagli orti e dai giardini i bidoni e/o secchi che non sono chiudibili con coperchi a vite
- 2) Introdurre in giardino dei pesci rossi, mangeranno le larve delle zanzare
- 3) Sfruttare le piante : Geranio, Citronella, Lavanda
- 4) Non bisogna utilizzare i sottovasi in quanto creano un ambiente favorevole per vivere
- 5) Sfruttare il rame
- 6) Usare le Bat-Box, nidi artificiali per pipistrelli
- 7) Usare l'olio di Neem



La zanzara tigre è distinguibile dalle altre perchè è nera, presenta bande bianche sulle zampe e di dimensioni ridotte. Punge di giorno ed è aggressiva. La durata di vita è di 40 giorni circa, depono quasi 400 uova e si sposta dal punto di nascita solo di 100 metri. Punge di giorno e vola basso. Colpisce prevalentemente le gambe.



Ufficio Ambiente

Redatto da Sara Morimanno

Stagista presso il comune di

Rignano Flaminio

Scuola: Aldo Moro (IPSASR)